

やまいのほなし

2025年3月号

内科・循環器内科・リハビリテーション科

森 医 院

<http://www.moriiin.com/>

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL : 058-251-4452

院長のブログ

<http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/>

ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	土	日
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	/
午後 4:00~ 7:00	○	○	○	/	○	/	/

Pickup!

どうして尿に糖が出るようになるのか？

尿の作られ方は特殊で、血液中の赤血球やタンパク質以外を一度全部捨ててしまい、そこから必要な物質を再度吸収するという形をとっています。なので、ブドウ糖も一度全部捨てられますが、ブドウ糖は体にとって絶対に必要なものですから、すべて再吸収されます。ところが、血糖が180mg/dL以上だと、すべてのブドウ糖は再吸収されずに、一部尿中に排泄されてしまいます。これが尿糖です。

この仕組みを逆手にとって、糖を再吸収させ難くして尿糖を増やして、血糖を下げる糖尿病治療薬が、SGLT2阻害薬です。現在、フォシーガ®、スーグラ®、ジャディアンス®、カナグル®、ルセフィ®、デベルザ®の6剤が発売されています。